

Những loại cây trồng trong nhà nguy hại nếu trẻ nhỏ lỡ ăn phải

Một số cây cảnh quen thuộc trong nhà như chuối ngọc, đỗ quyên, hồng môn,...rất nguy hại, thậm chí gây chết người nếu ăn phải.

Trồng [cây cảnh](#) trong nhà là nhu cầu của nhiều người nhằm đưa thiên nhiên vào nhà cho thêm phần sinh động và hơn cả là có ý nghĩa về mặt phong thủy với mong muốn giúp gia chủ mạnh khỏe, may mắn và phát tài phát lộc. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết hết về những tác hại của một số loại cây cảnh. Dưới đây là những loại cây có chất độc hại và có thể còn gây chết người nếu ăn phải.

Ngô đồng



T toàn thân cây, đặc biệt là củ và hạt có chứa chất độc curcin gây chóng mặt và buồn nôn nếu ăn phải.

Huệ Lily



[f Chia sẻ](#)

[g+ Chia sẻ](#)

Củ có chất độc lycorine gây tiêu chảy, buồn nôn, ói mửa nếu ăn vào. Nuốt phải nhựa cây có thể gây nôn mửa, tiếp xúc trực tiếp gây bỏng rát, ngứa da.

Thơm ỏi



[f Chia sẻ](#)

[g+ Chia sẻ](#)

Quả có chất độc lantanin alkaloid hoặc lantadene A gây bỏng rát đường ruột, giãn cơ, rối loạn tuần hoàn máu, thậm chí tử vong.

Đỗ quyên

 Chia sẻ

 Chia sẻ



Tất cả các bộ phận đều có chất độc andromedotoxin và arbutin glucoside. Từ 100 đến 225 g lá捣碎 đủ để gây ngộ độc nặng cho trẻ em 25kg.

Chuối ngọc



 Chia sẻ

 Chia sẻ

Toàn thân có chất glucosides gây mệt mỏi, khó thở, tiêu chảy nếu ăn phải.

Hồng môn

 Chia sẻ

 Chia sẻ



Có độc tố calcium oxalate và csparagine. Ăn phải bất kỳ bộ phận nào của loài hoa này có thể gây bỏng rát vùng họng, dạ dày và ruột.

Cẩm tú cầu



 Chia sẻ

 Chia sẻ

Lá và củ có chất hydragin-cyanogenic glycoside gây tiêu chảy, ói mửa, thờ gập.

Xương rồng bát tiên



 Chia sẻ

 Chia sẻ

Nhựa cây gây bỏng rát da khi tiếp xúc.

Thủy tiên



Củ có chất alkaloid gây chóng mặt, buồn nôn, tiêu chảy, run rẩy toàn thân, hôn mê, thậm chí tử vong khi ăn phải.

Trầu (trầu bà, trầu ông...)

[f Chia sẻ](#)

[g+ Chia sẻ](#)



Lá và thân có chất độc calcium oxalate gây tiêu chảy, buồn nôn, bỏng rát niêm mạc miệng khi ăn phải.

Tulip

[f Chia sẻ](#)

[g+ Chia sẻ](#)



Củ có chất tulipene, ăn vào sẽ gây chóng mặt, buồn nôn.

Lục bình

[f Chia sẻ](#) [g+ Chia sẻ](#)



Tất cả các bộ phận đều chứa độc, có thể gây chứng ăn không tiêu, ói mửa trên chó, mèo và một số vật nuôi khác khi ăn phải.

Cây thể kỷ (hay thùa)

[f Chia sẻ](#) [g+ Chia sẻ](#)



Theo khuyến cáo trên trang Homeguides, nhựa của cây này khá độc, có thể gây kích ứng da nghiêm trọng hoặc các vấn đề về tiêu hóa.

Hoa loa kèn Arum/ Ý lan

[f Chia sẻ](#) [g+ Chia sẻ](#)



Lá và củ đều có chất độc đường ruột calcium oxalate, gây ói mửa, bông rất bề mặt niêm mạc nếu ăn phải.

Môn kiểng



[f Chia sẻ](#) [g+ Chia sẻ](#)

Toàn thân có chất độc calcium oxalate và asparagine, dẫn đến nguy cơ bị bỏng, ngứa rát vùng miệng, niêm mạc ruột khi ăn phải.

Môn lá lớn



Tất cả bộ phận trên cây đều chứa chất calcium oxalate asparagine gây ngứa và bỏng rát cổ họng, tiêu chảy nếu ăn phải.

Anh Thảo



Củ có chất độc alkaloid gây khó tiêu, tiêu chảy, ói mửa nếu ăn phải

Dạ lan



[f Chia sẻ](#)

[g+ Chia sẻ](#)

Củ có độc tố alkaloid gây vọp bẻ, đầy bụng, buồn nôn, tiêu chảy nếu ăn phải.

Xương rồng kiềng

[f Chia sẻ](#)

[g+ Chia sẻ](#)



Nhựa gây bong da và mắt nếu tiếp xúc, ăn vào có thể gây tê cứng lưỡi và miệng, nôn mửa.

Trúc đào



Toàn thân có chất cực độc oleandrin, neriin gây ngộ độc khi chạm vào cây hoặc nuốt phải. Nhẹ thì gây buồn nôn, ói mửa, tiêu chảy, rối loạn nhịp tim, nặng có thể mất kiểm soát cơ thể, hôn mê, thậm chí tử vong.

Bã đậu



Nhựa cây màu trắng đục, có độc, được dùng làm thuốc diệt trùng.

Ngoất nghèo (Lily lửa)



[f Chia sẻ](#) [g+ Chia sẻ](#)

Củ và cây có chất kịch độc colchicine cùng một số alkaloid khác. Nếu ăn vào sẽ gây tê lưỡi, mất cảm giác, hôn mê, thậm chí tử vong.

Một số loại cà kiềng (chẳng hạn như cà độc dược)



[f Chia sẻ](#) [g+ Chia sẻ](#)

Loài thực vật này được còn được dùng làm thuốc, nếu dùng với liều khổng chế, có thể chữa ho hen, say sóng, trị mụn nhọt. Tuy nhiên, ở điều kiện bình thường, người tiếp xúc qua da với bất kỳ vị trí nào trên cây đều có thể bị nổi mẩn đỏ, ngứa, chóng mặt, nhức đầu, thấy ảo giác, hôn mê và có thể gây mù mắt hoặc tử vong.

Lưu ly



Cũng giống như cà độc dược, hoa lưu ly chứa chất độc có thể gây ngứa, nổi mẩn, chóng mặt, nhức đầu, ảo giác, hôn mê.

Thiên điều



Hoa và hạt có các chất gây ngộ độc đường ruột, tiếp xúc hoặc ăn vào sẽ khiến buồn nôn, tiêu chảy, chóng mặt.

Thông thiên (hay huỳnh liên)



 Chia sẻ

 Chia sẻ

Hoa, lá, quả và hạt có độc tố thevetin, neriin, glucozid, ăn vào có thể bị ngộ độc dẫn đến tử vong.

Vạn tuế



 Chia sẻ

 Chia sẻ

Vỏ, ngọn và hạt cây đều chứa chất độc có thể gây ung thư hoặc rối loạn thần kinh mãn tính. Các nhà khoa học khuyên không nên tiếp xúc thường xuyên hoặc đặt cây vạn tuế trong phòng kín bởi nó có thể gây bệnh, ngộ độc, thậm chí tử vong.

Lan chuông



f Chia sẻ

g+ Chia sẻ

Hoa và quả đều chứa chất độc có thể gây tử vong.

Anh đào đen (hay nightshade)



f Chia sẻ

g+ Chia sẻ



Ăn phải trái của cây này có thể bị mất giọng, hô hấp khó, co giật, đặc biệt nguy hiểm với trẻ nhỏ.

Trẻ nhỏ dưới 6 tuổi dễ bị ngộ độc từ [cây cảnh](#) độc hại

Những ca phát hiện ngộ độc cây cảnh có độc ở Việt Nam và trên thế giới thường xảy ra ở trẻ nhỏ. Tại TPHCM đã có một số trẻ nhỏ bị ngộ độc nặng do ăn quả mã tiền.

Tiến sĩ sinh học Bùi Văn Lệ (Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP.HCM) cho biết: "Có rất nhiều loại cây cảnh có khả năng gây ngộ độc cao. Ví dụ cây vạn niên thanh có tên khoa học là *Dieffenbachia cultivar*. Cây có thân mềm, lá xanh đốm trắng, thuộc họ ráy. Vì cây cũng đẹp nên hay được trồng làm cảnh. Tuy nhiên, độc chất của cây vạn niên thanh chính là calcium oxalate. Độc chất này phân bố trong các bộ phận của cây và chủ yếu trên lá. Khi nhai lá, ăn lá sẽ gây ra bỏng rất niêm mạc

miệng, da. Nếu tiếp xúc với nhựa từ lá có thể gây dị ứng da, bỏng miệng, cứng miệng, nghẹn họng và khó thở. Nếu ăn với số lượng nhiều có thể gây chết người. Vì chất độc trong cây vạn niên thanh không phải dạng khí hay bay hơi mà chỉ khi nuốt lá, ăn lá, nhai lá mới có các hiện tượng trên. Các triệu chứng trên đa số là nhẹ nhưng cần đưa ngay đến cơ sở y tế để được chỉ định hoặc cấp cứu kịp thời”.

Cho nên, với những cây cảnh độc hại tốt nhất không nên trồng trong nhà hoặc nếu trồng trong nhà thì chỉ nên đặt ở những khu vực tránh xa tầm với của trẻ em và phải luôn trông con trẻ cẩn thận. Đưa ra khuyến cáo hoặc viết chú ý đặt trên cây để tránh xảy ra những tình huống bị ngộ độc.